

JUMENT

PROTOCOLE SANITAIRE INTERNATIONAL AMÉNAGÉ 2010

RECHERCHE MÉTRITE CONTAGIEUSE ÉQUINE* (MCE) ET AUTRES MALADIES VÉNÉRIENNES BACTÉRIENNES

Avant toute saillie, s'assurer du statut sanitaire de la jument. Est considérée comme à haut risque toute jument ayant été contaminée ou infectée ou saillie ou ayant résidé dans un pays autre que la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Royaume Uni dans les 12 derniers mois. Se référer à la version intégrale du Code de Pratique International qui pourra être consulté et téléchargé sur www.syndicatdeseleveurs.org.

JUMENT BAS RISQUE :

| Site | Sinus et fosses clitoridiens* | | | Cervical | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| | Taylorella equigenitalis | Klebsiella pneumoniae | Pseudomonas aeruginosa | Taylorella equigenitalis | Klebsiella pneumoniae | Pseudomonas aeruginosa | Flore associée (1) |
| Juments vides et maidens | A faire, après le 1 ^{er} janvier, Résultat négatif | | | A faire, après le 1 ^{er} janvier, Résultat négatif | | | Interprétation vétérinaire |
| Juments pleines et suitées | A faire, après le 1 ^{er} janvier A moins de 30 jours avant le poulinage ou après le poulinage Résultat négatif | | | A faire, après le 1 ^{er} janvier, sur chaleur (dont de poulinage) Résultat négatif à envoyer à l'éta lonnier | | | Interprétation vétérinaire |

(1) La recherche, par culture, des autres germes doit faire l'objet d'une demande spécifique.

JUMENT HAUT RISQUE :

- 1) Obtention du statut bas risque : 2 fois deux prélèvements clitoridiens à 7 jours d'intervalle avec résultats négatifs,
- 2) Puis le protocole habituel bas risque ci-dessus.

RECHERCHE ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE (AVE)

Sur un prélèvement réalisé après le 1^{er} janvier et datant de moins de 30 jours avant la première saillie* avec :

- Soit un résultat sérologique négatif*,
- Soit deux résultats sérologiques positifs stables ou déclinants à 14 jours d'intervalle*,
- Soit un résultat sérologique, positif stable ou déclinant par rapport au dernier résultat de l'année précédente*.

Vaccinations obligatoires *

GRIPPE et RHINOPNEUMONIE : Avant la saillie

- Soit sur les 3 dernières années au moins un rappel annuel (tolérance 10 jours),
- Soit une primo vaccination : 2 injections espacées de 4 à 8 semaines d'intervalle puis un rappel au moins annuel.

RECOMMANDATIONS

- Des cas d'anémie infectieuse des équidés ayant été déclarés depuis 2006, les éta lonniers peuvent exiger que les juments soient accompagnées d'un test de Coggins, avec résultat négatif, sur un prélèvement sanguin réalisé après le 1^{er} janvier.
- Si la jument revient en chaleur notamment de façon anormale, il faut prévoir de refaire l'ensemble des prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes (germes spécifiques et flore associée).
- Si la jument est obligée de changer d'éta lon : il faut refaire, à 7 jours au plus tôt après la dernière saillie de l'éta lon précédent, l'ensemble des prélèvements MCE et autres maladies vénériennes bactériennes (germes spécifiques et flore associée) et AVE et attendre les résultats négatifs avant de la présenter au nouvel éta lon. Les résultats précédents doivent accompagner la jument à la saillie.
- Si la jument change de lieu de stationnement : il faut refaire tous les prélèvements

* Règlement obligatoire du Stud Book (www.haras-nationaux.fr)